

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

## Dauwpunt

**1 maximumscore 3**

- $G = \frac{17,27 \cdot 23}{237,7 + 23} + \ln\left(\frac{65}{100}\right)$  (= 1,09...) 1
- $T_d = \frac{237,7 \cdot 1,09...}{17,27 - 1,09...}$  (= 16,0...) 1
- 16,0... - 12 = 4,0... (°C), dus er ontstaat zichtbare condens op het glas 1

**2 maximumscore 5**

- Het inzicht dat bij een lagere luchtvochtigheid een lager dauwpunt hoort 1
- (Bij zeer onaangenaam hoort  $T_d \geq 24$  (en  $T_d < 26$ ), dus) de vergelijking  $24 = \frac{237,7 \cdot G}{17,27 - G}$  moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe de oplossing  $G = 1,58...$  kan worden gevonden 1
- De vergelijking  $\frac{17,27 \cdot 33}{237,7 + 33} + \ln\left(\frac{R}{100}\right) = 1,58...$  moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe de oplossing  $R = 59,3...$  kan worden gevonden, dus de minimale luchtvochtigheid was in Nederland 60(%) 1

of

- Het inzicht dat bij een lagere luchtvochtigheid een lager dauwpunt hoort 1
- (Bij zeer onaangenaam hoort  $T_d \geq 24$  (en  $T_d < 26$ ), dus) de vergelijking  $24 = \frac{237,7 \cdot G}{17,27 - G}$  moet worden opgelost 1
- De juiste substitutie van  $G$  in de formule voor het dauwpunt  $T_d$  1
- De vergelijking  $24 = \frac{237,7 \cdot \left(\frac{17,27 \cdot 33}{237,7 + 33} + \ln\left(\frac{R}{100}\right)\right)}{17,27 - \left(\frac{17,27 \cdot 33}{237,7 + 33} + \ln\left(\frac{R}{100}\right)\right)}$  moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe de oplossing  $R = 59,3...$  kan worden gevonden, dus de minimale luchtvochtigheid was in Nederland 60(%) 1

Vraag	Antwoord	Scores
<b>3</b>	<b>maximumscore 4</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>G = \frac{17,27 \cdot 20}{237,7 + 20} + \ln\left(\frac{R}{100}\right)</math></li> </ul>	1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>G = \frac{17,27 \cdot 20}{237,7 + 20} + \ln(R) - \ln(100) (= 1,34\dots + \ln(R) - \ln(100))</math></li> </ul>	1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>G = \ln(R) - 3,2648\dots</math></li> </ul>	1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>T_d = \frac{237,7 \cdot (\ln(R) - 3,2648\dots)}{17,27 - (\ln(R) - 3,2648\dots)} = \frac{237,7 \cdot (\ln(R) - 3,2648\dots)}{20,5348\dots - \ln(R)}</math> (en dit geeft</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>na afronden: <math>T_d = \frac{237,7 \cdot (\ln(R) - 3,265)}{20,535 - \ln(R)}</math></li> </ul>	1
<b>4</b>	<b>maximumscore 3</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschrijven hoe de vergelijking <math>\frac{237,7 \cdot (\ln(R) - 3,265)}{20,535 - \ln(R)} = 3</math> kan worden opgelost</li> </ul>	1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De oplossing is <math>R = 32,4\dots</math></li> </ul>	1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het antwoord: (<math>32,4\dots &gt; 30</math>, dus) nee, de relatieve luchtvochtigheid is niet schadelijk</li> </ul>	1

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

## Skûtsjesilen

**5 maximumscore 3**

- Skûtsjes die geen enkele wedstrijd winnen, hebben altijd een geheel aantal punten 1
- Een skûtsje dat 10 wedstrijden wint, heeft ook een geheel aantal punten 1
- Maar dan moet dit skûtsje alle 11 wedstrijden winnen, zodat bij dit skûtsje 1 keer winst niet meetelt, anders heeft een van de andere skûtsjes geen geheel aantal punten, dus het is mogelijk 1

**6 maximumscore 2**

- $\frac{2,15}{1,90} = 1,131\dots$  (of met behulp van een getallenvoorbeeld) 1
- Het antwoord: 13(%) 1

**7 maximumscore 4**

- Beschrijven hoe de vergelijking  $160,2 = 2,15 \cdot 17,13 \cdot (3,57 + 2D)$  kan worden opgelost 1
- Dit geeft:  $D = 0,38\dots$  (m) 1
- Invullen van de gegevens in formule 2016 geeft dan:  $S = 162,4\dots$  (m<sup>2</sup>) 1
- Het antwoord:  $(162,4\dots - 160,2 =) 2,2$  (m<sup>2</sup>) 1

**8 maximumscore 3**

- De vergelijking  $2,15 \cdot L \cdot (\frac{2}{3} \cdot 3,52 + 1,25 + 2 \cdot 0,42) = (3,2525 - 0,05L) \cdot L \cdot 3,52 + 25$  moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord:  $L = 18,52$  (m) 1

Vraag	Antwoord	Scores
<b>9</b>	<b>maximumscore 5</b>	
•	Het kiezen van een waarde voor $B$ , met $B > 0$ , bijvoorbeeld $B = 1$	1
•	Er geldt dan (bijvoorbeeld) $S = 3,2525L - 0,05L^2$	1
•	Daaruit volgt (bijvoorbeeld) $\frac{dS}{dL} = 3,2525 - 0,1L$	1
•	$\frac{dS}{dL} = 0$ geeft $L = 32,525$ (of $\frac{dS}{dL} > 0$ geeft $L < 32,525$ )	1
•	Voor $L < 32,525$ is $\frac{dS}{dL} > 0$ , dus voor $12 < L < 20$ is $\frac{dS}{dL} > 0$ , (en dus is voor een skûtsje de afgeleide van formule IFKS positief)	1
of		
•	Het kiezen van een waarde voor $B$ , met $B > 0$ , bijvoorbeeld $B = 1$	1
•	Er geldt (bijvoorbeeld) $\frac{dS}{dL} = -0,05 \cdot L \cdot 1 + (3,2525 - 0,05L) \cdot 1$ ( $= -0,1L + 3,2525$ )	2
•	$\frac{dS}{dL} = 0$ geeft $L = 32,525$ (of $\frac{dS}{dL} > 0$ geeft $L < 32,525$ )	1
•	Voor $L < 32,525$ is $\frac{dS}{dL} > 0$ , dus voor $12 < L < 20$ is $\frac{dS}{dL} > 0$ , (en dus is voor een skûtsje de afgeleide van formule IFKS positief)	1
of		
•	Het kiezen van een waarde voor $B$ , met $B > 0$ , bijvoorbeeld $B = 1$	1
•	Er geldt dan (bijvoorbeeld) $S = 3,2525L - 0,05L^2$	1
•	Daaruit volgt (bijvoorbeeld) $\frac{dS}{dL} = 3,2525 - 0,1L$	1
•	Voor $L = 12$ is $\frac{dS}{dL} = 2,0525$ en voor $L = 20$ is $\frac{dS}{dL} = 1,2525$	1
•	Omdat $\frac{dS}{dL}$ een lineaire functie is, geldt voor $12 < L < 20$ dat $\frac{dS}{dL} > 0$ (en dus is voor een skûtsje de afgeleide van formule IFKS positief)	1
of		
•	Het kiezen van een waarde voor $B$ , met $B > 0$ , bijvoorbeeld $B = 1$	1
•	Er geldt (bijvoorbeeld) $\frac{dS}{dL} = -0,05 \cdot L \cdot 1 + (3,2525 - 0,05L) \cdot 1$ ( $= -0,1L + 3,2525$ )	2
•	Voor $L = 12$ is $\frac{dS}{dL} = 2,0525$ en voor $L = 20$ is $\frac{dS}{dL} = 1,2525$	1
•	Omdat $\frac{dS}{dL}$ een lineaire functie is, geldt voor $12 < L < 20$ dat $\frac{dS}{dL} > 0$ (en dus is voor een skûtsje de afgeleide van formule IFKS positief)	1

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

*Opmerkingen*

- *Voor het tweede antwoordelement van het tweede en het vierde antwoordalternatief mag voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.*
- *Als in het tweede en het vierde antwoordalternatief de productregel niet is gebruikt voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.*
- *Als een kandidaat de uitkomsten van  $\frac{dS}{dL}$  voor de gehele getallen 13 t/m 19 berekent en daaruit concludeert dat  $\frac{dS}{dL}$  altijd positief is, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.*

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

### Waalbrug

**10 maximumscore 3**

- Beschrijven hoe de vergelijking  $-11 + 38,6 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{244}(x+122)\right) = 0$  kan worden opgelost 1
- Dit geeft  $x = 99,55\dots$  (en/of  $x = -99,55\dots$ ) 1
- Het antwoord: 199 (m) 1

**11 maximumscore 4**

- Herschaling in verticale richting met factor 1,17 geeft 1  

$$y = 1,17 \cdot \left(-11 + 38,6 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{244}(x+122)\right)\right)$$
- Verschuiving 1,87 omhoog geeft 1  

$$y = 1,17 \cdot \left(-11 + 38,6 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{244}(x+122)\right)\right) + 1,87$$
- Invullen van  $x = 0$  in de formules voor de boven- en de onderrand geeft 1  
 $y = 34,162$  en  $y = 27,6$
- Het antwoord:  $(34,162 - 27,6 =) 6,6$  (m) 1

of

- Herschaling in verticale richting met factor 1,17 geeft 1  

$$y = 1,17 \cdot \left(-11 + 38,6 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{244}(x+122)\right)\right)$$
- Verschuiving 1,87 omhoog geeft 1  

$$y = 1,17 \cdot \left(-11 + 38,6 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{244}(x+122)\right)\right) + 1,87$$
- Voor de afstand tussen de boven- en de onderrand geldt 1  

$$y = -11 + 45,162 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{244}(x+122)\right) - \left(-11 + 38,6 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{244}(x+122)\right)\right)$$
- Het antwoord: (de optie maximum geeft) 6,6 (m) 1

of

- Invullen van  $x = 0$  in de formule voor de onderrand geeft voor de hoogte van de onderste boog 27,6 1
- De hoogte van de bovenste boog is  $27,6 \cdot 1,17 + 1,87 (= 34,162)$  2
- Het antwoord:  $(34,162 - 27,6 =) 6,6$  (m) 1

*Opmerking*

*Voor het tweede antwoordelement van het laatste antwoordalternatief mag voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.*

Vraag	Antwoord	Scores
12	<b>maximumscore 4</b>	
	• (De evenwichtsstand ligt 11 m onder het wegdek, dus) $a = -11$	1
	• (De amplitude is 11, dus) $b = 11$	1
	• (De halve periode is 95, dus) $c = \frac{\pi}{95}$ (of $c = 0,03$ of nauwkeuriger)	1
	• (De grafiek begint bij $x = \frac{244}{2} + 7 = 129$ (m), dus) $d = 129$ (en dit geeft de formule: $y = -11 + 11 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{95}(x - 129)\right)$ )	1

*Opmerking*

Als een andere mogelijke waarde voor  $d$  is gegeven, bijvoorbeeld  $d = -61$  of  $d = 319$ , hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

## Bonte vliegvanger

### 13 maximumscore 4

- (Bijvoorbeeld) in 2008 is  $t = 10$  en  $V = 100$ ;  $(10, 100)$  invullen geeft  $100 = c \cdot 10^2 + 81$  1
- Beschrijven hoe de oplossing  $c = 0,19$  kan worden gevonden 1
- Invullen van  $t = 17$  in  $V = 0,19 \cdot t^2 + 81$  geeft  $V = 135,91$  1
- In 2015 was het aantal in werkelijkheid  $V = 150$  en een passende conclusie 1

### 14 maximumscore 4

- Het aantal volwassen vogels van type B dat in jaar  $n + 1$  de winter overleefd heeft, is  $0,5 \cdot B_n$  1
- Per nest vliegen 5 jongen uit, dit is 2,5 jong per volwassen vogel 1
- Hiervan overleeft 18%, dus het aantal jongen dat in jaar  $n + 1$  volwassen is geworden, is  $2,5 \cdot 0,18 \cdot B_n$  1
- Totaal is dat  $B_{n+1} = 0,5 \cdot B_n + 2,5 \cdot 0,18 \cdot B_n = 0,95 \cdot B_n$  1

of

- Per nest overleeft 1 volwassen vogel de winter 1
- Per nest overleven  $5,0 \cdot 0,18 (= 0,9)$  jongen de winter 1
- Dus per nest overleven  $(1 + 0,9 =)$  1,9 vogels 1
- Dat is per vogel  $\frac{1,9}{2} = 0,95$  (dus  $B_{n+1} = 0,95 \cdot B_n$ ) 1

### 15 maximumscore 3

Een oplossing als:

- Het maken van tabellen voor  $B_{n+1} = 0,95 \cdot B_n$  met bijvoorbeeld beginwaarde  $B_0 = 5000$  en  $A_{n+1} = 1,09 \cdot A_n$  met beginwaarde  $A_0 = 1000$  1
- $B_{11} = 2844, \dots$  en  $A_{11} = 2580, \dots$  1
- $B_{12} = 2701, \dots$  en  $A_{12} = 2812, \dots$ , dus na 12 jaar 1

of

- De directe formules zijn  $A_n = 1,09^n$  en  $B_n = 5 \cdot 0,95^n$  1
- Beschrijven hoe de vergelijking  $A_n = B_n$  kan worden opgelost 1
- De oplossing is  $n = 11,7 \dots$ , dus na 12 jaar 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

**16 maximumscore 2**

- Het invullen van  $b = 1 - a$  in  $N(t)$  geeft
 
$$N(t) = 60\,000 \cdot (a \cdot 1,09^t + (1 - a) \cdot 0,95^t)$$
1
- $N'(t) = 60\,000 \cdot (a \cdot \ln(1,09) \cdot 1,09^t + (1 - a) \cdot \ln(0,95) \cdot 0,95^t)$   
 (en dit geeft bij benadering
 
$$N'(t) = 60\,000 \cdot (a \cdot 0,086 \cdot 1,09^t - (1 - a) \cdot 0,051 \cdot 0,95^t)$$
1

**17 maximumscore 3**

- Bij 1998 hoort  $t = 14$ , dus er moet gelden  $N'(14) = 0$  1
- Beschrijven hoe de vergelijking
 
$$60\,000 \cdot (a \cdot 0,086 \cdot 1,09^{14} - (1 - a) \cdot 0,051 \cdot 0,95^{14}) = 0$$
 kan worden opgelost 1
- Het antwoord: 8(%) van type A en 92(%) van type B 1

*Opmerking*

*Als gewerkt is met  $N'(t) = 60\,000 \cdot (a \cdot \ln(1,09) \cdot 1,09^t + (1 - a) \cdot \ln(0,95) \cdot 0,95^t)$  uit vraag 16, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

**Afname van de kindersterfte in Mali**

**18 maximumscore 4**

- In 1900 was de kindersterfte  $\frac{12}{33,1} \cdot 100$  (= 36,2...) 1
- In 2007 waren er  $4,8 \cdot 33,1$  (=158,88) (miljoen kinderen) 1
- In 2007 was de kindersterfte  $\frac{12-2,8}{158,88} \cdot 100$  (= 5,7...) 1
- De kindersterfte was in 2007 dus  $\frac{36,2...}{5,7...} = 6$  keer zo klein (of 1/6 keer zo groot) 1

**19 maximumscore 3**

- De groeifactor per jaar is  $e^{0,0203} = 1,0205...$  1
- De groeifactor per 10 jaar is dus  $1,0205...^{10} = 1,2250...$  1
- Het antwoord: 22,5(%) 1

of

- $\frac{240\,900 \cdot e^{0,0203 \cdot (t+10)}}{240\,900 \cdot e^{0,0203 \cdot t}}$  1
- Herleiden geeft  $e^{0,203} = 1,2250...$  1
- Het antwoord: 22,5(%) 1

**20 maximumscore 3**

Een afleiding als:


- Voor  $P$ , het percentage kinderen dat sterft, geldt  $P = at + b$  met  $b = 41,2$  1
- $a = \frac{11,4 - 41,2}{2015 - 1960}$  (= -0,54...) 1
- $S = 0,01 \cdot (-0,54... \cdot t + 41,2) \cdot 240\,900 \cdot e^{0,0203t}$  herleiden tot  $S = (99\,251 - 1305t) \cdot e^{0,0203t}$  1

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

**21 maximumscore 4**

Een redenering als:

- $S' = -1305 \cdot e^{0,0203t} + 0,0203 \cdot (99\,251 - 1305t) \cdot e^{0,0203t}$  (of een gelijkwaardige uitdrukking) 2
- Een schets van de grafiek van  $S'$  1



- Na  $t = 30$  (na 1990) ligt de grafiek van  $S'$  altijd onder de  $t$ -as en is de waarde van  $S'$  steeds meer negatief (dus de afname van de kindersterfte  $S$  gaat steeds sneller) 1

of

- $S' = (709,7953 - 26,4915t) \cdot e^{0,0203t}$  (of een gelijkwaardige uitdrukking) 2
- Bij  $t = 30$  is  $709,7953 - 26,4915t$  negatief 1
- Voor alle  $t > 30$  (na 1990) is  $709,7953 - 26,4915t$  steeds meer negatief en  $e^{0,0203t}$  is altijd positief, dus de waarde van  $S'$  wordt steeds meer negatief (dus de afname van de kindersterfte  $S$  gaat steeds sneller) 1

*Opmerkingen*

- Voor het eerste antwoordelement mag voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.
- Als de product- en/of kettingregel niet is gebruikt, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

## Rondetijden

### 22 maximumscore 6

Voorbeelden van juiste uitwerkingen zijn:

- De 7 volledige ronden moeten worden afgelegd in minder dan  $(300 - 23,3 =) 276,7$  (s) 1
- De tijd van de eerste volledige ronde is  $1,65 \cdot 23,3 = 38,445$  (s) 1
- De rondetijden van de overige 6 volledige ronden zijn  $38,445 + v$ ,  $38,445 + 2v$ ,  $38,445 + 3v$ , ...,  $38,445 + 6v$  (met  $v$  het verval) 1
- De totale tijd van de 7 volledige ronden is dus  $269,115 + 21v$  1
- Beschrijven hoe de vergelijking  $269,115 + 21v = 276,7$  kan worden opgelost 1
- Het antwoord: 0,36 (s) 1

of

- De 7 volledige ronden moeten worden afgelegd in minder dan  $(300 - 23,3 =) 276,7$  (s) 1
- De tijd van de eerste volledige ronde is  $1,65 \cdot 23,3 = 38,445$  (s) 1
- Het inzicht dat vanwege het lineaire karakter de eerste en de laatste volledige ronde evenveel van de gemiddelde rondetijd verschillen 1
- De gemiddelde rondetijd is  $(276,7 : 7 =) 39,52\dots$  (s) 1
- De gemiddelde rondetijd is de tijd van de vierde volledige ronde, dus  $39,52\dots = 38,445 + 3v$  (met  $v$  het verval) 1
- Het antwoord: 0,36 (s) 1

of

- De 7 volledige ronden moeten worden afgelegd in minder dan  $(300 - 23,3 =) 276,7$  (s) 1
- De tijd van de eerste volledige ronde is  $1,65 \cdot 23,3 = 38,445$  (s) 1
- Een formule voor de tijd  $T_n$  van de  $n^e$  volledige ronde is  $T_n = 38,445 + v(n-1)$  (met  $v$  het verval) 1
- De vergelijking  $\sum_{k=1}^7 T_k = 276,7$  moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: 0,36 (s) 1

---

## Compensatiescore

---

### 23 maximumscore 20

Volgens vakspecifieke regel 4c bedraagt de aftrek voor fouten zoals bedoeld onder 4a en/of fouten bij het afronden van het eindantwoord voor het hele examen maximaal 2 scorepunten.

Indien u bij een kandidaat voor deze fouten in het hele examen meer dan 2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u hier een compensatiescore toe.

- Als u meer dan 2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u het aantal in mindering gebrachte scorepunten dat meer is dan 2 toe.

Voorbeeld:

U heeft voor deze fouten in het hele examen 5 scorepunten in mindering gebracht. Ken dan bij deze component een compensatiescore van 3 toe.

- Als u 2 of minder scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u een compensatiescore van 0 toe.

---

## Bronvermeldingen

---

Skûtsjesilen

corlaffra/Shutterstock.com ID: 571098052

Waalbrug

Verhoef/Shutterstock.com ID: 1944037708

Bonte vliegenvanger

WildlifeWorld/Shutterstock.com ID: 1389303344

Rondetijden

Evelien1009/wikipedia.org (of: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thialf\\_ijsbaan.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thialf_ijsbaan.jpg))